

سطح ۳ ارائه خدمت	سطح ۲ ارائه خدمت	سطح ۱ ارائه خدمت	اندیکاسیون های مراقبت بارداری، زایمان و پس از زایمان
indications			Standard 19
کلیه اندیکاسیونهای سطح 2	کلیه اندیکاسیونهای سطح 1	مادر سالم با بارداری بدون عارضه	مراقبت های بارداری PNC
فشارخون مزمن کنترل نشده و یا End organ damage	فشار خون مزمن بدون End Organ Damage با کنترل مناسب دارویی	سابقه سزارین با چک محل جفت (در صورت اکرتا یا اینکرتا ارجاع به سطح 3)	
مننژیت با کاهش هوشیاری	پره اکلامپسی یا سابقه آن بالای 34 هفته (در موارد زیر 34 هفته پس از مشاوره با سطح 3)	سابقه poor outcome pregnancy (پس از مشاوره با سطح 3)	
آمبولی ریه پس از تثبیت وضعیت مادر	سابقه پره اکلامپسی شدید (مشاوره با سطح 3)	مادر تهدید به سقط	
پره ترم کمتر از 32 هفته یا IUGR شدید	سابقه سقط مکرر و زایمان زودرس (مشاوره با سطح 3)	سابقه سقط راجعه (مشاوره با سطح 3)	
سابقه دیابت طولانی مدت	انواع دیابت (به شرط عدم وجود End Organ Damage) در صورت امکان ارجاع به سطح 3	نمایش غیرطبیعی	
بیماری نارسایی عضوی همراه با بارداری	آنمی شدید مادر (مشاوره با سطح 3) $Hb > 7$	مادر با آنمی خفیف، متوسط	
بیماری قلبی شدید	بیماریهای قلبی low risk و moderate risk (در صورت وجود کاردیولوژیست)	قد زیر 150 سانتیمتر	
نارسایی کلیه	بیماریهای زمینه ای مادر (کلیوی، خونی، ...) (مشاوره با سطح 3)	مادر زیر 18 سال	
دو قلوبی با مشکل، چند قلوبی	دوقلوئی بدون عارضه	سابقه زایمان سخت یا سریع	
بیماری های اتوایمیون (میاستینی گراو، ...)	جفت سر راهی	سابقه آتونی	
سابقه کبد چرب بارداری	پلی هیدرامنیوس و الیگو هیدرامنیوس (مشاوره با سطح 3)	رحم میوماتو	
سابقه دو بار یا بیشتر دکلمان (کنترل از هفته 28 بارداری)	سابقه دو بار یا بیشتر دکلمان (کنترل تا 28 هفته بارداری)	سابقه یک بار دکلمان	
بیماری هیپرتیروییدی و هیپوتیروییدی کنترل نشده	هیپرتیروییدی کنترل شده	هیپوتیروییدی کنترل شده	
نمایه توده بدنی $< 40$	$< 40$ نمایه توده بدنی $< 35$	نمایه توده بدنی $> 35$	
جنین ناهنجار با قابلیت حیات	post date	سابقه IUGR یا نوزاد ناهنجار با مشاوره سطح 3	
آسم کنترل نشده و هر نوع بیماری ریوی	ابتلاء به TORCH (مشاوره با سطح 3)	ناهنجاری رحمی (پس از مشاوره با سطح 3)	
	صرع	سابقه IUGR (مشاوره با سطح 3)	
	مادر معتاد (مشاوره با سطح 3)	سابقه پره ترم (مشاوره با سطح 3)	
	زایمان زودرس کنترل شده		
	آسم		

تهوع و استفراغ شدید بارداری بدون اختلال متابولیکی	کلیه اندیکاسیونهای سطح 1	کلیه اندیکاسیون های سطح 2
مثبت HIV، HCV، HbsAg اگر نارسایی عضوی وجود ندارد	فشار خون مزمن	اختلال هوشیاری، تشنج
مادر تب دار (پس از مشاوره با سطح 3)	پره اکلامپسی زیر 34 هفته پس از مشاوره با سطح 3	کریو آمنیونیت
	پارگی کیسه آب بالای 32 هفته	مننژیت با کاهش هوشیاری
	پیلو نفریت	IUGR شدید یا پره ترم
	شکم حاد بارداری	ناهنجاری viable
	پره ترم بالای 32 هفته یا وزن جنین بالای 1800 گرم که دردهای زایمانی را بتوان مهار کرد.	TTS و Trap
	پنومونی	سابقه کاردیومیوپاتی در طی یا بعد از بارداری
	مننژیت	فقدان یا معکوس شدن جریان پایان دیاستول قبل از 33 هفته
	FUO	
	بیماریهای زمینه ای مادر (کلیوی ، خونی ، ...)	
	تهوع و استفراغ شدید کنترل نشده	
	DVT	
	انواع دیابت در بارداری بدون نارسایی عضوی	
	کلستانز بارداری	
	آنمی شدید	
	آمنیو ریداکشن (پس از مشاوره با سطح 3)	
	بیماریهای قلبی low و moderate risk (در صورت وجود کاردیولوژیست)	
موارد طبیعی	کلیه اندیکاسیون های سطح 1	کلیه اندیکاسیون های سطح 2
نمایش غیرطبیعی	جفت سر راهی	اختلال هوشیاری، تشنج
دو قلوبی ترم	دوقلوئی بالای 32 هفته	کریو آمنیونیت و پارگی کیسه آب کمتر از 32 هفته
ناهنجاری کشنده در جنین	آمبولی ریه (تثبیت وضعیت مادر و ارجاع به سطح 3)	متریت توکسیک
پلی هیدرآمنیوس خفیف، بدون ناهنجاری جنین در سونوگرافی	پلی هیدرآمنیوس متوسط تا شدید و الیگو هیدرآمنیوس	مننژیت با کاهش هوشیاری
ناهنجاری رحمی	IUGR ترم ، بالای 1000 گرم	HELLP syndrome
سابقه سزارین	مادر معتاد	کبد چرب بارداری و هیپاتیت

**اندیکاسیون های بستری مادر در زمان بارداری**

**اندیکاسیون های بستری مادر جهت زایمان و پس از زایمان**

فاز فعال زایمان زیر 25 هفته	مادر تب دار	IUGR شدید یا پره ترم
زایمان اجتناب ناپذیر	زایمان پره ترم 32 هفته و بالاتر	دکلمان به همراه مرگ داخل رحمی، DIC یا نارسایی کلیه
سابقه زایمان سخت یا سریع	آبله مرغان حین زایمان	BMI > 40
سابقه مول	مادر دیابتیک	زایمان TTS و Trap
انجام زایمان مادری که سابقه مرده زایی با نوزاد ترم فعلی سالم دارد (پس از مشاوره)	آزمی شدید	پره اکلامپسی و اکلامپسی با نارسایی عضوی
سابقه نوزاد ناهنجار با نوزاد فعلی سالم (پس از مشاوره)	ناهنجاری جنین بدون قابلیت حیات	ناهنجاری جنین با قابلیت حیات
زایمان و آزمی خفیف و متوسط	بیماریهای قلبی low و moderate risk (در صورت وجود کاردیولوژیست)	پره اکلامپسی کمتر از 34 هفته که نیاز به ختم بارداری داشته باشد
اورژانس های مامایی در زمان زایمان مانند جفت سرراهی، دکلمان در صورت جنین زنده یا دیسترس تنفسی	IUFD	زایمان پره ترم کمتر از 32 هفته یا وزن جنین کمتر از 1500 گرم
زایمان بالای 36 هفته	DVT	جفت سرراهی اکرتا و اینکرتا (گرید 3 و 4 که درحال خونریزی فعال نیستند)
انواع سقط ها به جز سقط عفونی	اکلامپسی بدون organ failure	PROM <= 32 w
متریت پس از زایمان	PROM > 32 w	سپسیس بعد از زایمان و در صورت عدم پاسخ به درمان تا 48 ساعت
تعداد بارداری 4 و بالاتر	سپسیس بعد از زایمان و پاسخ به درمان تا 48 ساعت	
سن بالای 16 و زیر 37 سال		
پره اکلامپسی (تثبیت وضعیت مادر و ارجاع به سطح 2)		
سابقه دیابت در بارداری ولی با BS نرمال در حاضر		
بیماری فشارخون مزمن ولی کنترل شده		